



Fontol

Ibuprofeno 2 %

Suspensión oral - Uso pediátrico

Industria Argentina

Venta libre

Fórmula cualicuantitativa:

Cada 100 mL de suspensión contiene:

Ibuprofeno 2,00 g
Azúcar, Metilparabeno sódico, Propilparabeno sódico,
Carboximetilcelulosa sódica, Twenn 60, Ciclamato de sodio,
Aerosil 200, Amarillo oca, Esencia en polvo naranja,
Sacarina sódica, Agua purificada.

Acción Terapéutica:

Analgésico-Antifebril, Antiinflamatorio.

Uso del medicamento. Lea detenidamente esta información.

Está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfriados y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

Cómo usar este medicamento:

Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla. Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad. En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

TABLA DE DOSIFICACIÓN:

Peso en kilos	Edad (años)	Dosis (ml)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 ml
16 a 21	4 a 5	7,5 ml
21 a 27	6 a 8	10 ml
27 a 32	9 a 10	12,5 ml
Más de 32	Más de 10	15 ml

En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.

No administrar más de 3 veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

Precauciones:

Consulte con su médico en estos casos si:

- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antiérmicos o

antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.

- Si está deshidratado (pérdida de muchos líquidos) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.

- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.

- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.

- Aparecen síntomas nuevos.

- Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. En esta eventualidad consulte con su médico.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o esta embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Advertencias:

Salvo indicación médica:

No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antitérmicos.

No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y 5 días para el dolor.

No utilizar contra el dolor de estómago

Reacciones adversas

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

Sobredosis:

Ante eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones.

• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/ 2247

• Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ 4658-7777

• Centro De Asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

Presentaciones: Envases con 120 ml

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 33.671

CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE, A MENOS DE 30°C Y EN SU ENVASE ORIGINAL.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Laboratorios DUNCAN S.A.

Tronador 543 (C1427CRK) - CABA

Elaborado en: Tronador 229/41/55 - (C1427CRE) - CABA

Dirección Técnica: ADRIANA PÉREZ - Farmacéutica.

COD P-6-76-21