

PRESENTACIÓN:

PRAVIL 20 mg: envases con 15 y 30, 100 500 y 1000 cápsulas de microgránulos gastrorresistentes. Estas últimas tres presentaciones para venta hospitalaria.

FORMA DE CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a 30° c, en lugar seco, al abrigo de la luz y en su envase original.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Fecha de última revisión: 26/11/2025

Especialidad medicinal autorizada por el ministerio de salud de la Nación.
Certificado N° 50.354

Laboratorios Duncan S. A.

Tronador 543 (C1427CRK) - CABA

Elaborado en: Tronador 229/41/55 (C1427CRE) - CABA

Directora Técnica: SILVIA SALLAGO - Farmacéutica.

COD. P-1-813-25



Pravil

Omeprazol 20 mg

**Cápsulas de microgránulos
gastrorresistentes
Vía de administración: Oral**

Industria Argentina

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE PRAVIL?

Cada cápsula de Pravil de 20 mg contiene: OMEPRAZOL 20 mg (como principio activo).

Excipientes: Manitol, Fosfato dihidrogeno de sodio, Laurilsulfato de sodio, Carbonato de calcio, Almidón, Azúcar, Esferas de azúcar, Metilparabeno sódico, Propilparabeno sódico, Hidroxipropilmetilcelulosa E5, Eudragit L-30D, Hidróxido de sodio, Dietiltalato, Talco, Dióxido de titanio, Polisorbato 80, Agua purificada.

ACCIÓN:

Reduce la producción de ácido estomacal.

¿PARA QUÉ SE USA PRAVIL?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PRAVIL?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez. No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico si:

- tiene dificultad o dolor al tragar la comida,
- tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones,
- tiene diarrea prolongada o que no mejora,
- acidez desde hace más de tres meses,
- acidez con mareos o transpiración,
- dolor de pecho frecuente y hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello,
- dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez,
- pérdida de peso inexplicable,
- dolor de estómago, náuseas o vómitos,
- trastornos renales y/o hepáticos.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.

Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos),

Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes),

Diazepam (medicamento sedante),

Digoxina (medicamento para el corazón),

Teofilina (medicamento broncodilatador),

Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores),
Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamentos para la infección VIH-SIDA),

Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Omeprazol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.

Tome una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.

No rompa ni mastique las cápsulas.

No exceda la dosis de una cápsula diaria sin consultar a su médico.

No tome por más de 14 días sin consulta médica.

Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

No se debe tomar omeprazol como medicación preventiva.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a los siguientes teléfonos:

ANMAT Responde: 0800 333 1234